

8 juil 1775

n° 174.

Mémoire sur La guérison
de deux amygdales tumescées
opérées par le moyen d'un instrument
nouveau

Par le S^r Icart correspondant de
L'Académie Royale de Chirurgie
Lieutenant de M. le premier Chirurgien
du Roy Chirurgien-major de L'hôpital de Saint

La nature, toujours nouvelle et toujours variée,
ne se fait pas plus admirer dans L'ordre et l'harmonie
qu'on remarque dans ses productions, que dans
L'irrégularité et l'espèce de désordre qu'elle se plaît
quelquefois à faire régner dans ses ouvrages.

ARC 52 n° 56



D'un côté elle nous montre sa grande puissance ; de l'autre elle occupe les esprits les plus profonds par divers phénomènes qu'elle produit sans cesse. Cette variété, dont la nature semble se jouer, en augmentant nos travaux, les perfectionne de plus en plus, et nous fait jouir de l'agrément et de la satisfaction de voir nos connoissances augmentées, dans les recherches de l'art de guérir, déjà portées au delà des autres sciences.

En vain le germe de nos maux se cache dans ces recoins obscurs, où l'œil de l'observateur ne pourroit pénétrer : la main de l'artiste industrieux, guidée par une théorie lumineuse, et soutenue par l'expérience, va bientôt le découvrir dans ces retraites profondes, et l'arracher de son poste. Mais si nous connoissons aujourd'hui le traitement de la plupart des maladies chirurgicales ; nous en sommes redevables à la célèbre

academie Royale de Chirurgie, et aux decouvertes ingenieuses
des Maîtres, qui se sont appliqués à Etudier la
nature; soit dans la marche qu'elle suit d'ordinaire,
soit dans les écarts où elle paroît s'égarer. C'est
ainsi que leurs moyens, indiqués avec précision et
employés avec sagesse, ont rendu la pratique de la
Chirurgie plus heureuse, plus facile et plus sûre.

Il suit de là que le raisonnement le plus spécieux
devra toujours céder à l'observation. En effet, c'est sur
elle seule qu'on peut et qu'on doit s'assurer, pour
établir une doctrine certaine: mais sur nombre d'objets,
quoiqu'observés par des grands maîtres, nous sommes
encore loin de la certitude.

Les amygdales tumescées, par exemple, sont
placées au nombre de ces faits qui embarrassent, de nos
jours, le Chirurgien le mieux instruit et le plus expérimenté.



On connoitroit encore bien moins ces affections des
amygdales, sans le savant mémoire de M. Lenoir,
inséré dans le quatorzième tome des mémoires de
L'academie Royale de Chirurgie. Cet academicien célèbre
a recueilli tous les faits, depuis l'else jusqu'à nous;
et les a présentés d'une manière si claire, et si
précise, qu'on ne peut s'empêcher de rendre un juste
hommage, et à L'importance de L'ouvrage, et à la vaste
érudition de son auteur.

Cependant, quoique cette dissertation intéressante
sur la excision des amygdales ne laisse rien à désirer,
cet homme, digne d'être écouté, dit: que L'expérience
reflectée pourra enmener des nouvelles perfectiones, que
L'academie se fera un plaisir de recevoir, et un devoir
de publier.

Encouragé par cette promesse, qu'il me fût

permis de faire paraître à l'Académie des succès que
j'ay obtenus par un instrument de mon invention
sur deux amygdales que j'ay opérées et guéries, avec
la plus grande facilité, et sans le moindre inconvénient.
Le court espace de temps qu'a duré l'opération a causé
dans le spectateur un si grand étonnement, qu'il n'a
pu s'empêcher de manifester l'impression; une demy-
minutte a suffi, tant pour porter l'instrument dans
le gosier, que pour faire la ligature. Cet instrument est
également propre pour la rescission de ces glandes: on n'a
besoin d'aucun aide; l'instrument seul suffit, tant pour
abaisser, que pour assujettir la langue.

On sçait que l'extirpation des amygdales a long-
temps occupé la plupart des maîtres de l'art; aujourd'hui
même on n'en par encore d'accord sur la manipulation
de cette opération ni sur le genre d'instruments qui



convienient le plus, en qu'on voit employé de préférence,
pour le traitement de cette maladie. Les uns, ont mis
en usage le cautère actuel; les autres le potentiel: ceux
cy, le feu et la ligature).

Ceux qui ont employé ces différents moyens,
semblent cependant donner la préférence à l'instrument
tranchant; mais cette préférence ne paroît fondée, qu'à
raison de la difficulté de porter la ligature sur cette
partie, et de la faire avec succès: cette difficulté
devient encore plus grande, lorsque la base de l'amygdale
se trouve plus étendue que sa surface; pour s'en convaincre,
il n'y a qu'à lire le rapport de ceux qui l'ont mise
en usage, et qui sont déjà cités dans le mémoire de
M. Louis.

feu M. Lecan paroît le partisan de cette méthode,
quoiqu'il ne doit pas l'encourager.

il rapporte dans le recueil périodique d'observations
de Médecine, Chirurgie et Pharmacie, du mois de février
1755. tome II. que l'extirpation des amygdales, par
l'instrument tranchant, n'en pas sans quelque danger
d'hémorragie; et il en des sujets sanguins, des
amygdales variqueuses, où ce danger peut être plus
évident.



Dans ce cas là, dit-il, il en plus sûr
d'extirper ces glandes, en les faisant tomber, comme les
polypes par la ligature.

Pour faire cette opération longue, compliquée et
douloureuse, il faut avoir deux équilles courbes, dont la
courbure soit une portion de cercle, excepté près de l'œil
de l'équille, où il faut qu'elle se redresse et s'allonge
un peu, en forme de tangente du même cercle; que leur
grandeur soit telle, qu'il y ait de la pointe à l'œil

de l'équille, environ seize ou dix-sept lignes, et
qu'ainsi sa courbe fasse la portion d'un cercle, d'environ
sept à huit lignes de rayon.

Enfiler chacune de ces équilles de deux fils
finés, doubles, très-forts; faire en sorte que chacun de
ces fils soit de différente couleur, comme blanc et
rouge, afin de les reconnaître; que ces fils aient au
moins dix-sept pouces, et enfilés les de façon, que
le bout enfilé n'ait que deux à trois pouces, afin que,
quand les équilles sont passées dans les glandes et
hors de la boute, les bouts de fil soient loin hors de
la glande, et qu'on puisse aisément les distinguer, et
les dépasser hors des yeux de l'équille.

Choisissez, dit-il, du fil fort, par préférence
à la soie; celle-cy est plus cassante; j'y ay été attrappé
et obligé de recommencer cette pénible opération,

parce qu'une semblable ligature d'étoffe se cassa en la
faisant.

ayant fait placer votre malade commodement,
mettre l'une de vos aiguilles dans un porte-aiguille
bien solide.



Passez cette aiguille à travers l'amygdale
et Kirreuse, obliquement de haut en bas, et de devant en
arrière, afin de n'être pas autant exposé à attrapper
les cloisons, qu'on le seroit en passant à travers
directement; commençant sous la cloison antérieure, que
vous écarterez avec une feuille de Myrthe, et finissant
en bas, contre la cloison postérieure, que vous écarterez
pareillement, avec l'ongle du doigt index, de l'autre main,
recevant la pointe de l'aiguille contre le dedans, et le long
du dedans du même doigt.

Il faut ensuite pousser l'aiguille près de son œil,
s'il en est possible, de façon que le doigt index, le long duquel

coule le dos de sa pointe et de son tranchant, puis
avec le pouce de la même main saisir solidement
cette partie de l'équille par un bon tiers au moins
de sa longueur.

Alors on degage l'équille du porte équille,
et de l'autre main on achève de faire passer l'équille
en ce fil à travers de l'amygdale en hors de la
bouche. M. Lecat prévient que l'on soit solidement saisi
de l'équille, auparavant que de lâcher le porte équille;
parceque dans une operation de cette espèce qu'il fit,
le malade par un fort mouvement de deglutition lui
arracha des doigts une équille qu'il avoit passée du
dedans au dehors, et l'auroit avalée si il ne l'eut
rattrappée, comme elle entrois dans le Pharynx; ce
qu'il ne fit pas sans beaucoup de peine; ayant à combattre
alors des mouvements convulsifs tres violents de ces organes.
D'ailleurs ses doigts étoient couverts d'un muillage gluant,

qui faisoit glisser tout ce qu'il vouloit pincer.

L'Équille étant passée et hors de la bouche, on en ôte le fil : alors vous reconnoîtrez vos fils rouge et blanc, et avec chacun d'eux vous ferez une ligature, dont l'une embrasse la moitié postérieure supérieure de l'amygdale, et a par conséquent son nœud à la partie supérieure et postérieure, et l'autre embrasse la moitié antérieure inférieure de la même glande, et a par conséquent son nœud à cette partie antérieure inférieure de la surface de cette glande : faites ce nœud double, c'en à dire, vous passez le fil deux fois dans l'anse, mais vous ne faites que ce nœud, et vous le serrez avec le porte ligature simple, qui doit être muni d'un manche, pour ne pas blesser la main de l'opérateur : il faut aussi que le fil, qui passe au travers du porte ligature, soit tenu ferme et un peu tiré par un aide, tandis que l'opérateur tire l'autre de sa main gauche. Le fil qu'on tire doit être



faire plusieurs tours autour de la main qu'il seroit bon
d'en M. Lefar de garnir d'un linge; car il en est essentiel
de serrer fort et long temps, afin que la ligature serre
fortement la substance même solide des organes, et que
les liqueurs de la région serrée aient le temps de se
s'échapper, et de faire place au fil qui, sans cela, seroit
lâche le moment d'après.

On fait par la même manœuvre la ligature
à la glande de l'autre côté; après quoy on fait passer
chaque paquet de fil, par le coin de la bouche, qu'on
enveloppe d'un linge, et qu'on attache au bonnet.

Voilà la manœuvre longue et pénible dont
M. Lefar s'est servi, pour la ligature des amygdales,
et le danger auquel il s'est exposé, et a exposé son
malade d'avaler une de ces grosses éguilles, qui auroit
certainement causé une mort prompte et violente.

L'opération des amygdales exige la plus grande attention soit pour la ligature ou pour la rescission. On doit éviter, autant qu'il est possible, la multiplicité des instruments: cette partie étant pour être la moins commode pour la main du chirurgien; la plus gênante pour le malade, et la plus susceptible de mouvements involontaires.

La manière de détruire les amygdales, ou d'emporter l'excédent, paroit former toute la difficulté.

Les différents moyens qu'on a employés en divers tems, ont chacun leur mérite; quoique la plupart soient susceptibles de grands inconvénients: tels sont le cautère actuel et le potentiel. Il peut résulter du premier de fortes inflammations, qui mettront le malade en danger d'être suffoqué; parceque l'action du feu s'étend plus loin que la partie cauterisée; D'ailleurs, ce moyen est un épouvantail pour les malades; sur tout étant obligé



de le répéter plusieurs fois; n'étant pas possible par
une seule application de détruire tout l'excédent de
l'amygdale, lorsqu'elle a un besoin indispensable d'être
retranchée.

Le cautère potentiel me paroit encore plus
dangereux que le premier, par la difficulté qu'il y a
d'y porter les corrosifs, en de borner leur effet sur
l'amygdale: de quelque façon qu'on y porte la pierre
à cautère ou la pierre infernale, elles ne peuvent agir
ni former d'escarre, qu'en se fondant; et il faut encore
qu'elles restent un temps suffisant sur la partie, pour
produire l'effet désiré. or donc comment sera-t'il possible
de borner l'effet du corrosif, sans que les parties voisines
ne soient touchées? n'est-il pas encore dangereux que cette
pierre, qui se trouvera presque fondue par son effet naturel,
ou par l'humidité de la partie, n'échappe du porte pierre,
et ne procure des accidens mortels, en tombant dans
l'estomac? comment le malade pourra-t'il souffrir

Cette application, pendant un certain temps, pour former
une escarre assez forte pour détruire l'excédent de
l'amygdale, sans qu'il ne soit tourmenté d'une toux
violente, de mouvements de deglutition &c. Les autres
différents corrosifs sont sujets aux mêmes inconvénients.



Il ne reste donc d'autre moyen que la ligature ou
la rescission par l'instrument tranchant; le dernier trouvera
encore des difficultés, de la part des malades pusillanimes,
qui ne veulent pas seulement entendre parler d'incision,
et ils ont assez de courage pour souffrir quatre fois plus,
pourvu qu'il ne soit pas question de couper. 1.^o par la
ligature, on est exempt d'hémorragies. 2.^o elle porte
la mortification, au delà même de la ligature. 3.^o Les
malades ne sont nullement effrayés; ce qui en de la
plus grande considération, à raison du lieu où l'on doit
opérer, où le plus petit mouvement que le malade fait,
est capable d'interrompre l'opération de la faire traîner

en longueur, et l'exposer à des accidens fâcheux; comme au renversement de l'amygdale sur la glotte, lorsqu'elle n'a été coupée qu'en partie de haut en bas, à l'hémorragie qui peut encore vous déranger, si on incise trop près de sa base, et donner l'alarme à l'opérateur et à l'opéré.

L'instrument que j'ay l'honneur de présenter à l'academie met à l'abri de tous ces inconveniens, puisque une demy minutte suffit pour faire la ligature, ou la rescision par l'instrument tranchant, on n'a besoin d'ailleurs d'aucun aide, et il n'en résulte aucun accident; comme on va le voir par l'observation suivante.

M^{lle} D'Esse de Genève, âgée de quatorze ans, a été; depuis l'age de dix jusques à douze, — sujette à de violents maux de gorge; le son de sa voix fut entièrement changé, accompagné d'une difficulté d'avaler et de respirer. Elle fut visitée par quelque

Médecin et Chirurgien, qui assurèrent aux parents
que la Demoiselle avoit un polype qui descendoit
dans le gosier. M. D'Esse qui a acheté un bien
dans la province de Languedoc, fit venir sa fille,
et la conduisit à Castres le 15. juin 1779. La
Demoiselle fut visitée, en présence de M. Malzac
habile médecin de Castres. Au premier aspect nous
crûmes effectivement que cette masse du gosier étoit
un corps polipeux; mais ne voyant point de luette,
je la cherchai avec l'Espatule, et en relevant la cloison
du palais, je la tirai d'entre les deux corps charnus
qui paroissoient n'en former qu'un. Ces deux glandes
tumescées qui étoient collées l'une contre l'autre, tant
leur volume étoit considérable, n'avoient point cette dureté
scléreuse; mais elles ^{étoient} fermes et résistées, et à peine
pouvais-je passer le doigt entre, je proposai au père



de la malade les moyens curatifs; mais il me
demanda un délai, pour pouvoir assister aux couches
de son épouse. La malade ne revint donc à l'astre
que le 20^e août, accompagnée de Madame sa mère.

J'avois eu le temps de réfléchir sur les moyens
curatifs, et sur le choix que je devois donner aux
différentes méthodes pratiquées: je donnai donc la
préférence à la ligature; tant pour complaire à la
malade, qui m'avoit déjà annoncé qu'elle ne se laisseroit
rien couper, que par l'idée avantageuse de pouvoir faire
la ligature avec facilité, par le moyen de l'instrument
que je venois d'imaginer. En effet, l'opération de
la première amygdale ne dura pas une minute,
et la ligature fut si bien faite, que le cinquième jour
l'amygdale tomba. J'eus l'attention de ne pas faire
la ligature de la seconde, que lorsque la première seroit

tombée, et que le malade ne souffrit plus, par la
crainte que quelque forte inflammation ou gonflement
considérable ne suffoquât le malade. La seconde
Ligature ne fut donc faite que cinq à six jours après
la chute de la première, avec encore plus de facilité;
puisqu'il ne fallut qu'environ demy minute pour cela;
et l'amygdale tomba vers la fin du quatrième jour.

Tout ce que je puis certifier, c'est qu'il n'en arriva
aucun accident: Le malade n'a pas eu un moment
de fièvre, ni même eu besoin d'être saignée. La seule
douleur que le malade ait éprouvée, a été à l'oreille, du
même côté; Le premier jour de chaque opération qui se
dissipa chaque soir dans les vingt quatre heures.
Les opérations ont été faites sous les yeux des
Médecins et Chirurgiens de cette ville, qui ont même
suivi le traitement.



Description de l'instrument.

L'instrument, dont j'ay l'honneur d'envoyer la figure à l'academie, est aussi simple que facile à s'en servir: C'est une branche de fer, coudée à son extrémité, pour pouvoir se mouler à la partie; Cette courbure posée à plat sur la langue, l'abaisse et l'assujettit: à son extrémité en un anneau de rechange, monté en vis, pour les différentes grosseurs des amygdales, parcequ'il faut que l'anneau soit proportionné au volume de la glande.

Dans cet anneau il y a un petit rebord en dedans pour enchaîner la ligature, qu'on y pose toute faite à double nœud, afin que l'amygdale, en entrant dans l'anneau, ne puisse pas la déranger: à ses deux côtés il y a un trou pour passer le fil de la

ligature, qu'on passe ensuite dans deux autres
trous, qui sont au milieu de L'arbre. On porte ensuite
L'anneau sur L'amygdale, et on la fait entrer dans
L'anneau; Lorsqu'elle en est suffisamment engagée dans
cette ouverture, on prend les deux fils de l'autre main
que l'on tire fortement vers le manche. La ligature
ainsi bien serrée, on degage les fils de l'instrument,
et en le tirant hors la bouche, on tire les fils en
même tems: il faut qu'ils soient assez longs pour
pouvoir être attachés au bonnet.



Dans le cas que la ligature se lâche, on la
reserre par le moyen de deux petites baguettes percées
au bout par un petit trou, par les quels on fera
entrer chacun des fils attachés au bonnet. on fera
couler ces baguettes de long du fil, jusques près de
L'amygdale, et en tournant les deux petites baguettes

dans un sens contraire, on serre la ligature aussi
fortement qu'on veut. il faut que le fil qui sert à
la ligature soit fort: pour moy, je me suis servi
d'une ficelle très mince.

Si on veut faire tomber toute l'amygdale, on
n'a qu'à porter l'anneau jusqu'à sa base; mais si
l'on ne veut emporter que l'excédent, on ne porte
l'anneau que vers le milieu. C'est en faisant sortir
par l'ouverture de l'anneau, plus ou moins de cette
glande, qu'on en est maître de n'en lier qu'autant
qu'on veut.

Si l'on veut se servir de ces instruments pour
la rescission des amygdales, par l'instrument tranchant,
on l'applique de la même manière que pour faire la
ligature: On fait passer l'amygdale dans l'anneau qui
la tient ferme et immobile, et on fait couler suie le

plus de l'anneau un petit scalpel à bouton et en
pressant un peu fortement le tranchant sur
l'amygdale, et le plus du tranchant sur l'anneau.
L'opération est faite dans l'instant. De cette façon,
il n'est pas possible d'intéresser aucune partie,
parce que l'anneau vous sert de point d'appui et
de conducteur au scalpel, et on n'extirpe que la
portion que l'on veut, en ne faisant sortir hors de
l'anneau, que la portion que l'on veut retrancher.



